

# آلہ کی عمومی ماتا

## بیماری کی بیچان

آلہ کی عمومی ماتا کی بیماری بیکثیریا کی وجہ سے ہوتی ہے جسے ننگی آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ آلہ پر بھورے رنگ کے سخت کارک کی طرح کے اُبھرے ہونے دھبے نظر آتے ہیں جو بڑھ کر اپس میں مل جاتے ہیں اور سارے آلہ کو متاثر کر دیتے ہیں۔ اس کی علامات آلہ بننے کی ابتداء کے وقت محسوس ہوتی ہیں اور آلہ کے برداشت ہونے پر اسانی سے دیکھی جا سکتی ہیں۔ اس بیماری کی وجہ سے آلہ اندر سے نرم ہو جاتے ہیں۔

**پس منظر**  
 بیمار آلو جو زمین میں پڑے رہیں اس بیماری کا باعث بننے والی اور متاثرہ زمین میں نئی فصل کاشت کرنے سے آلو کی فصل کو یہ بیماری لک جاتی ہے۔ اس بیماری کا حملہ زمینی تعامل (پی ایچ) بڑھنے سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ زخمی آلہ میں اس بیماری کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ آلہ بننے کے 2 سے 3 بفتے کے دوران گرم مرطوب زمینی حالات کی وجہ سے بیماری کے بڑھنے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ یہ بیماری بو، پانی، بارش، بیماری سے متاثرہ الہوں اور زرعی الات کی وجہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہے۔ یہ بیماری کھیت میں موجود جڑی بوٹیوں پر بھی زندگی گزار سکتی ہے۔

Scab on potato variety Doré  
 (Photo by Rasbak (CC BY-SA))



## مینجمنٹ / کنٹرول

تدرست بیج ہونیں جو ایسی فصل سے حاصل کیا گیا ہو جو تمام بیماریوں سے مبرأ ہو۔  
 بمیش بیماری کے خلاف قوت مدافعت رکھنے والا بیج استعمال کریں (مثلاً سانتے اور سمپلی ریڈ وغیرہ)  
 متاثرہ کھیت میں 2 سے 3 سال تک آلو کی فصل کاشت نہ کریں اور دوسری فصلات مثلًا پھلی دار فصلات اور جوار وغیرہ کے ساتھ فصل کا ادل بدل 3 سے 5 سال کی بنیاد پر کریں۔  
 آلہ بننے کے دوران اور آلہ بننے کے 2 سے 6 بفتے بعد تک زمین میں پانی کی کمی/خشکی نہ آئے دین۔  
 تیزابی خواص کی حامل کھاد مثلًا امونیم سلفیٹ اور ڈی اے پی زمین کی تیاری کے وقت استعمال کریں تاکہ زمین کی پی ایچ کم رہے۔  
 جیسم (کیلشیم سلفیٹ) کا استعمال زمین کے لیے بہتر ثابت ہوتا ہے۔ لیکن جیسم کو تیزابی خواص کی حامل کھادوں کے ساتھ ملا کر استعمال نہ کریں کیونکہ یہ ایک دوسرے کے اثرات کو زائل کر دیتی ہیں۔  
 آلہ بننے کے دوران کھیت سے جڑی بوٹیاں تلف کر دین۔  
 فصل کی برداشت کے بعد گرشته فصل کے باقیات کو اکٹھا کریں اور کھیت سے دور کسی جگہ پر جلا دیں تاکہ اگلے سال بیماری سے بچا جا سکے۔

(Photo Common scab of potato by Florida Division of Plant Industry Archive, Florida Department of Agriculture and Consumer Services (CC BY-NC))



UGA5259067

**سپرے کی احتیاطیں:**  
 کیمیائی زبروں (کیٹے مار زبریں، جڑی بوٹی مار زبریں، پھیپھوندی کیش ادویات) کو استعمال کرنے سے پہلے لیبل پر دی گئی بداعیات کو غور سے پڑھیں۔ سپرے کے دوران پاتھوں پر ریڑ کے لمبے دستانے، سر پر پکڑی/ٹوبی، انکھوں پر عینک (Goggles) اور چہرے پر ماسک لگائیں۔ سپرے کے دوران کھانے بینے اور تمباکو نوشی سے پریز کریں۔ سپرے مکمل کرنے کے بعد دن کے آخر میں اچھی طرح نہائیں۔ استعمال کے بعد سپرے کے خالی ٹبوں کو زمین میں کبرا گڑھا کھوود کر دبا دیں۔ فصل کی برداشت (کٹائی) اور آخری سپرے کے دوران تجویز کردہ مناسب وقفہ رکھیں۔ کسی بھی قسم کی ایمنجننسی کی صورت میں بیسٹی سائیڈ کے لیبل سمیت قریبی ڈاکٹر سے فوری رجوع کریں۔

کیمیائی زبروں کے استعمال کے دوران حفاظتی لیاس پہنیں اور لیبل پر دی گئی بداعیات برائے مجازہ مقدار اور وقت استعمال، فصل کی کٹائی اور اخیری سپرے کے وقفہ پر عمل کریں۔

Scientific name(s) > *Streptomyces scabies*

The recommendations in this factsheet are relevant to: پاکستان



Authors: Plantwise Pakistan  
 Supporting Institution: CABI CWA  
 tel: +92 51 8317071 email: [y.khan@cabi.org](mailto:y.khan@cabi.org)

Plantwise Edited by