

# کنترول زراعتی مور خوشة جواری

## شناسائی مشکل

مور خوشة جواری یکی از آفات مهم جواری بشمار می‌رود که بدختانه از چندین سال به اینظرف در کشور ما در ساحتیکه جواری کشت می‌شود مشاهده شده و خسارات هنگفتی به حاصلات جواری رسانیده است. این آفت بار اول در سهاران افریقا دیده شده بود که البته سه نوع آن بالای جواری حمله می‌کند، مورخیمه جواری افریقایی، مور داغ کننده ساقه جواری، مور گلابی ساقه جواری

## مقدمه

مور خوشة جواری ساقه نبات جواری را سوراخ نموده و از داخل انساج ساقه تغذیه می‌کند که در نتیجه نبات پژمرده می‌شود و بالآخره از بین میرود. لاروای حشره مذکور در ابتداء بالای نباتات جوان حمله می‌کند که اولاً از برگ‌ها تغذیه نموده و بعداً به داخل ساقه میرود. تخم‌های این حشره مدور بوده به رنگ کریمی زرد مانند بالای سطح تخم گذاری مینماید و لاروای آن به رنگ کریمی سفید مانند می‌باشد بعضی اوقات به رنگ خاکستری هم می‌باشد. و پیوپای آن به رنگ زرد نصواری مانند و جladar می‌باشد. رنگ آن تا حدی وابسته به موقعیت و فصل تغیر می‌کند.



Photo by ( مور بین ساقه جواری )  
International Institute of  
Tropical Agriculture, Flickr, CC  
(BY-NC)

## کنترول

- کشت انواع مقاوم نبات در مقابل آفت که در اکثر کشورها قابل دسترس می‌باشد.
- کشت نمودن نباتات مانع کننده آفت مانند گیاهان خاندان باقلایان یعنی که این بوی این گیاه مانع کننده حشره بالغ آفت مذکور می‌باشد.
- کشت حد اقل سه قطار علف بنام یوگندا/نپایر در گردآگرد مزرعه جواری.
- و کشت نباتاتیکه میزبان برای آفت نباشد بشکل متناوب در بین مزرعه جواری مثل نخود یا نشا استه.



نمودن شرایط صحی مانند داشتن ماسک، کلاه، دستکش، عینک و لباس‌های مخصوص که از دوکان‌های ادویه جات زراعتی خریداری کرده میتوانید

Scientific name(s) > *Chilo partellus*

The recommendations in this factsheet are relevant to: Afghanistan



Authors: حنیف عطاءالله  
ریاست حفاظه نباتات و قرطیین  
tel: (+93)700600515 email: af.hanif@gmail.com

Plantwise Edited by